



PM-A4-287-01

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بیمارستان حضرت علی (ع)



اقدامات درمانی عبارتند از:

به هیچ وجه چیزی را از راه دهان نخورد.

زغال فعال داده شده توسط پرستاران را بخورد تا دارو سریعتر از بدن دفع شود.

از محل سرم مراقبت شود تا سرم وصل شده به بیمار و داروی مورد نیاز به پایان برسد.

برای کنترل تشنج باید داروی تجویز شده توسط پزشک استفاده شود.

بیشترین مسمومیت در افراد جوان
و با داروی امی تریپتیلین رخ میدهد.

حداکثر زمان بروز علائم مسمومیت
در ضد افسردگی هادر عرض 2 الی 6
ساعت ایجاد میشود.

علائم مسمومیت با ضد افسردگی ها:

شامل افت فشار خون و
تپش قلب * تشنج * افزایش درجه
حرارت بدن و افت سطح هوشیاری
می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

مسمومیت با
ضد افسردگی ها
(آموزش به بیمار)

تهیه کننده
زهرا صمیمی
کارشناس پرستاری
1398



PM-A4-287-01

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بیمارستان حضرت علی (ع)



منبع:

1- کتاب اورژانس های داخلی و اطلاعات
دارویی ایران - بهنام ثبوتی *مهمدی
موسوی *افشین امینی

2-Nutrition and Diagnosis-Related
Care ,8th edition

تایید کننده:

دکتر حسین صناعی زاده متخصص مسمومیت
ها

5

بعد از شروع رژیم غذایی بایستی مایعات
فراوان مصرف گردد جهت خروج سریعتر
داروها از بدن و برگشت عملکرد کلیه ها
و کبد.

ممکن است در اثر مسمومیت با این دارو
خشکی دهان اتفاق بیفتد لذا نیاز است از
آبناتهای ترش و مایعات خنک بیشتر
استفاده شود. مکیدن تکه های یخ هم
توصیه می شود.

بعلت بروز یبوست توصیه میشود
میوه هایی با فیبر بالا مثل انجیر
و آلو زیاد استفاده شود.

4

طپش قلب یکی از نشانه های احتمال
تشنج میباشد که باید به مانیتور بیمار
توجه شود و توسط پرستار به همراه
آموزش داده شود.

بیماری که دست به اقدام مصرف بیش از
حد داروهای ضد افسردگی میزند حتما
بعد از بهبودی علایم حیاتی و هوشیاری
کامل باید توسط روانشناس
وروانپزشک ویزیت شود و علت
این کار بررسی گردد.

3