



PM-A4-285-01

### علایم مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

بزازق فراوان - اشک ریزش - تاری دید - استفراغ - اسهال - بی اختیاری ادرار - کاهش ضربان قلب - کاهش فشارخون - گیجی - احساس خفگی - تشنج - نارسایی قلبی - تعریق

### در مواجهه با بیمار آلوده به سم

لباسهای بیمار را اگر آلوده به سم و استفراغ یا اسهال شده باشد باید خارج کرده و پوست را با آب و صابون بیمار باید فوراً از محل آلوده خارج شود و در هوای آزاد نگهدارید

□ هرگز در مسمومیت بدون احتیاط شیر یا چربی و مایعات دیگر داده نشود زیرا این امر ممکن است منجر به تشدید مسمومیت شود.  
شستو دهید .



دانشگاه علوم پزشکی شیراز  
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

### مراقبت در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره

### آموزش به عموم

تهیه کننده

علی امینی

کارشناس پرستاری

تابستان 1401



PM-A4-285-01

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  
بیمارستان حضرت علی (ع)



□ اولین علامت در بیمار مسمومیت با ارگانوفسفره، بوی سم و ترشحات فراوان می باشد

□ در صورت مسمومیت پوستی، شستشوی اولیه پوست با آب و صابون انجام شود. در ادامه شستشو با اتیل الکل میتواند مفید باشد. در صورت موجود نبودن آب مراقبت در منزل

• در صورت نیاز پیگیری مشاوره های روانپزشکی جهت بیمار به موقع انجام شود

• در صورت نیاز به انجام آزمایشات طبق دستور پزشک اقدام کرده و مجدد جهت چک وضعیت بیمار به پزشک مراجعه کنید

• در صورت نگهداری سموم در منزل، آن را امحا کرده و از دسترس خارج کنید

• در صورت استفاده در کشاورزی از ماسک و وسایل حفاظتی استفاده کنید. میتوان آرد یا خاک روی پوست زد

**منبع :** درسنامه داخلی جراحی برونوسودارث  
2018

**تاییدکننده :** دکتر محمد مهدی علی بیگی  
متخصص مسمومیت ها