



PM-A4-262-01

تشخیص به موقع کاملاً قابل درمان است. در صورتی که کاندید نمونه برداری از پروستات شده اید، به پذیرش اتاق عمل بیمارستان مراجعه کنید و نوبت بگیرید. در تاریخ اعلام شده توسط پذیرش اتاق عمل، برای تشکیل پرونده، ناشتا مراجعه کنید. پس از طی مراحل تشکیل پرونده و انجام آزمایشات لازم تاریخ روز عمل به شما اعلام می شود و معمولاً از شما خواسته می شود به خانه برگشته و در ساعت مشخص شده در روز عمل به اتاق عمل مراجعه کنید.

ملاحظات قبل از عمل:

- آسپرین، پلاویکس و وارفارین یا دیگر داروهای ضد انعقاد ۷ تا ۱۰ روز قبل از عمل باید قطع شود.
- از یک روز قبل از عمل، طبق تجویز پزشک خود آنتی بیوتیک مصرف کنید. (در صورتی که عفونت ادراری دارید، قبل از عمل باید رفع شده باشد).
- روز عمل برای پاک کردن روده ها و کاهش خطر عفونت، از شیاف ملین (بیزاکودیل) استفاده کنید.
- از شب قبل از عمل فقط مایعات مصرف کنید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
بیمارستان حضرت علی (ع)

پروستات غده ای است به اندازه یک گردو که در قسمت خروجی مثانه آقا بان قرار گرفته است و در باروری آنها نقش دارد. از غده پروستات پروتئینی به نام PSA ترشح و وارد خون می شود و میزان طبیعی آن زیر ۴ است. افزایش در میزان PSA می تواند به علت عفونت، احتباس ادراری، تحریکات جنسی، دستکاری و معاینه پروستات، اندازه بزرگ پروستات و یا سرطان پروستات باشد. در نتیجه PSA بالاتر از ۴ و یا روند صعودی آن را باید جدی گرفت. کسانی که پدر، برادر یا عموی مبتلا به بیماری سرطان پروستات داشته اند، ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان پروستات دارند و در نتیجه از سن ۴۰ سالگی به بعد حتماً باید PSA خون را به طور سالانه چک کنند.

راه های غربالگری سرطان پروستات:

- معاینه انگشتی (پروستات سفت و مثل سنگ می شود).
 - اندازه گیری PSA خون
- راه تشخیص سرطان پروستات، نمونه برداری از پروستات است. سرطان پروستات در صورت



دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)

TRUS BX
نمونه برداری از پروستات

تهیه کننده:
آتوسا شادمان
کارشناس هوشبری
تابستان ۱۳۹۷ بازنگری تابستان ۱۴۰۱

PM-A4-262-01

- ادامه داشته باشد که طبیعی است.

منبع: برونرسودارث ۲۰۱۸

- WWW.mayoclinic.org
- WWW.urology_isf.ir

تایید کننده: دکتر شهریار ضیغمی - متخصص
جراحی کلیه و مجاری ادراری

- درد در ناحیه عمل طبیعی است و با خوردن یک مسکن خوراکی مثل استامینوفن رفع می گردد.
- سوزش ادراری طبیعی است و کوتاه مدت، با مصرف مایعات و خوردن مسکن به تدریج بهبود می یابد.
- احتیاس ادراری ندرتاً اتفاق می افتد و ممکن است برای شما به صورت موقت سوند ادراری وصل شود. (در صورتی که پس از ترخیص این اتفاق برای شما افتاد به اتفاقات بیمارستان یا درمانگاه نزدیک به منزل خود مراجعه کنید).
- تب و لرز و بی حالی شدید می تواند نشانه ای از عفونت باشد در نتیجه سریعاً به بیمارستان مراجعه کنید.
- آنتی بیوتیک ها را طبق دستور پزشک خود مصرف کنید.
- ۱ روز نیاز به استراحت در منزل خواهید داشت.
- هر روز ۶-۸ لیوان آب بنوشید.
- ممکن است متوجه مقدار کمی خون در ادرار، مدفوع شوید و تا ۳ روز ممکن است

- از ۸ ساعت قبل از ساعت اعلام شده برای حضور در بیمارستان، هیچ نوشیدنی یا خوراکی مصرف نکنید، استحمام کرده و موهای ناحیه عمل خود را شیو کنید.
- عمل نمونه برداری از پروستات:**
- معمولاً به صورت سرپایی یا بی حسی یا آرام بخشی انجام می شود. پروب مخصوص سونوگرافی را وارد مقعد کرده و با سوزن مخصوصی تعداد ۶ تا ۱۴ عدد نمونه از طریق دیواره روده از پروستات برداشته و برای تشخیص نهایی به آزمایشگاه می فرستند.
- پس از عمل:**
- پس از طی مراحل قانونی پرونده و هشیار شدن شما، از بیمارستان مرخص می شوید. رسید نمونه ها به شما تحویل داده می شود. رسید را جهت تحویل گرفتن نمونه ها نگهداری کنید. پس از آماده شدن جواب نمونه ها (معمولاً ۲ هفته تا یک ماه) همراه با جواب نمونه و شرح عمل به جراح مربوطه مراجعه کنید. ادامه درمان براساس جواب نمونه خواهد بود.